

鎮咳祛痰
"中美"
靜咳膠囊
TINCO Capsules "C.M."

衛署藥製字第016158號

【成分】

有效成分及含量：(Each Capsule Contains)

Dextromethorphan HBr.....	20mg
Carbinoxamine Maleate.....	4mg
DL-Methylephedrine HCl.....	25mg
Potassium Guaiacolsulfonate.....	90mg
Noscapine.....	20mg

其他成分(賦形劑)：

Silicon Dioxide、Lactose Monohydrate、Magnesium Stearate

Capsule成分：

Gelatin、Purified Water、Glycerine、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Sunset Yellow FCF、New Coccine

【用途(適應症)】

鎮咳、祛痰(感冒、咽喉炎、急性慢性支氣管炎、支氣管擴張、支氣管氣喘引起的咳嗽及咳痰困難)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

- (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- (二) 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(SSRI)的人。

二、有下列情形者，請洽醫師診治：

- (一) 6歲以下。
- (二) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
- (三) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
- (四) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
- (五) 有心臟病及65歲以上的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：

- (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
- (三) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項

- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二) 避免陽光直射。
- (三) 勿超過建議使用量。
- (四) 不要服用本藥超過七日。
- (五) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
- (六) 不得與酒精性飲料併用。

【用法用量】

12歲以上	一日3次，每次1顆
12歲以下	請洽醫師診治

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- (三) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- (四) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

【包裝】6-1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

【類別】醫師藥劑生指示藥品

委託者：

SINC 興中美生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區瑞光路618號5樓之1 電話:02-87513383

製造廠：



PIC/S GMP藥廠

中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線: 04-7524166

http://www.chungmei.com.tw