

“中美” **潔芙樂** 乳膏  
JIE FU LE CREAM "C.M."

衛署藥製字第 029463號

**【成分】有效成分及含量：( Each gm Contains )**

Miconazole Nitrate .....	20mg
Hydrocortisone .....	10mg

其他成分(賦形劑)：Cream Base Wax N-80、Propylene Glycol、Isopropyl Myristate、Glyceryl Monostearate、Lanolin Anhydrous、Cetyl Palmitate、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Bouquet、Osmanthus Flavor、Purified Water

**【用途(適應症)】**皮膚因真菌群或念珠菌種所引起之皮膚感染症。

**【使用上注意事項】**

- 一、有下列情形者，請勿使用：
  - (一)曾因本藥成分引起過敏。
- 二、有下列情形者，請洽醫師診治：
  - (一)3歲以下。(二)有深部皮膚組織感染。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  - (一)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。(二)正在接受醫師治療。(三)患部在臉上。(四)患部化膿。
- 四、其他使用上注意事項
  - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (二)避免陽光直射。
  - (三)勿超過建議使用量或使用次數。
  - (四)使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
  - (五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
  - (六)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
  - (七)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
  - (八)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
  - (九)一般黴菌感染療程至少為2週，視感染的程度、部位而定。
  - (十)請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。
  - (十一)本藥(含類固醇抗發炎成分)不可連續使用超過7天。
  - (十二)皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
  - (十三)小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
  - (十四)癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。

**【用法用量】**

皮膚感染症、灰指甲、 陰道感染	一日1~3次，塗布於患部，直至症狀消失，並繼續使用至痊癒為止
嚴重頑癬	一日2~4次，可視症狀適宜增減之

**【警語】**

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)若有上述外之其他不適情況產生。
- (二)自覺狀況沒有改善或更惡化。
- (三)一般黴菌治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4週，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。即使症狀改善停藥後，病情復發亦應立即就醫。

**【包裝】**1000公克以下鋁軟管裝

**【儲存條件】**25°C以下避光儲存

委託者：



製造廠：



PIC/S GMP藥廠  
中美兄弟製藥股份有限公司  
彰化市彰南路106號 諮詢專線：04-7524166  
http://www.chungmei.com.tw