

# "中美" 痔爽乳膏

CO-HEMORRHOID CREAM "C.M."

衛署藥製字第 045805 號

- 【藥理作用】1. Hydrocortisone Acetate：皮質荷爾蒙，具消炎、抗過敏、抗搔癢作用，可緩解痔瘡之腫脹。  
2. Lidocaine：局部麻醉劑，緩解痔瘡之癢及痛感。  
3. Zinc Oxide：局部收斂劑，具保護及輕度防腐作用。  
4. Allantoin：刺激組織形成，加速傷口癒合作用。

## 【成分】有效成分及含量：(Each gm Contains)

Hydrocortisone Acetate .....	2.5mg
Lidocaine .....	30mg
Allantoin .....	5mg
Zinc Oxide.....	50mg

其他成分(賦形劑)：Menthol、Labrafil M1944、Gelot 64、Atomized Glyceryl Dipalmito Stearate、DMDM Hydantoin、Sorbic Acid、Purified Water

## 【用途(適應症)】

緩解因痔瘡所引起的症狀(疼痛、灼熱、搔癢、腫脹、痔出血、潰瘍)。

## 【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
- (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
  - (二) 傷口化膿的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
- (一) 未滿12歲。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
- (一) 正在接受醫生治療痔瘡的人。
  - (二) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (三) 如果使用本藥7天後仍需繼續使用。
- 四、其他使用上注意事項：
- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (二) 避免陽光直射。
  - (三) 勿超過建議使用量或使用次數。
  - (四) 使用前，請以中性肥皂和溫水清潔患部，並以衛生紙或柔軟毛巾輕拍到乾。
  - (五) 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
  - (六) 本藥限於肛門外部或直腸末端內使用，不得內服。

## 【用法用量】

成人及12歲以上	取適量塗抹於肛門部位，每日不可超過3次。若需使用於直腸內，請將所附之軟管注入器套於軟管口，插入肛門直腸內使用之。(為便於使用，必要時得以蹲式使用之。)
未滿12歲	請洽醫師診治

## 【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	起疹、發紅、發癢、腫脹、乾燥感、熱感、刺痛感、發炎、疼痛
其他	刺激感、化膿

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：  
(一) 若有持續出血情況。(二) 若有上述外之其他不適情況產生。(三) 使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。(四) 休克(過敏性反應)，使用後立即產生如皮膚癢、聲音嘶啞、打噴嚏、喉嚨搔癢、呼吸困難、心悸、意識不清等。(五) 手腳疲倦、麻痺、緊繃、僵硬、無力、肌肉酸痛、不明瘀青、流鼻血、牙齦出血、臉色蒼白、疲勞、心悸、氣喘、暈眩、血尿、發燒、發冷等症狀。

【包裝】1000公克以下鋁軟管裝

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存條件】25°C 以下避光儲存

委託者：

 **興中美生技有限公司**  
Sino Advance Biotech Co., Ltd.  
台北市內湖區瑞光路618號5樓之1 電話:02-87513383

製造廠：

 **中美兄弟製藥股份有限公司**  
PIC/S GMP藥廠  
彰化市彰德路106號 諮詢專線: 04-7524166  
http://www.chungmei.com.tw