


廣效抗黴菌治療劑
“中美”
皮愛潔乳膏
PICOSONE® Cream “C.M.”

衛署藥製字第028115號

**【作用】**

本劑為水溶性乳膏，其主要成分 Econazole Nitrate，用來治療皮癬菌、黴菌、及革蘭氏陽性菌等所引起的皮膚病及發炎。Triamcinolone Acetonide 則具有抗發炎、抗過敏、抑制搔癢等作用，此兩種成分之藥量比例可各自發揮效用，而不會相互產生抑制作用。

【成分】有效成分及含量：(Each gram contains)

Econazole Nitrate.....10mg
Triamcinolone Acetonide.....1mg

其他成分(賦形劑)：Cream Base Wax、Propylene Glycol、Isopropyl Myristate、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Glyceryl Monostearate、Lanolin Anhydrous、Butylated Hydroxyanisole、Silicon Oil、Bouquet NO.1、Bouquet NO.2、Purified Water

【用途(適應症)】

治療皮膚淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。緩解濕疹或皮膚炎。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：(一)曾因本藥成分引起過敏。
二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(一)3歲以下。(二)有深部皮膚組織感染。
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：(一)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。(二)正在接受醫師治療。(三)患部在臉上。(四)患部化膿。
四、其他使用上注意事項：(一)為防止兒童誤食請妥善保管。(二)避免陽光直射。
(三)勿超過建議用量或使用次數。(四)使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。(五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。(六)本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，濕疹，浸潤、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。(七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。(八)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌

面積為參考)。(九)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。(十)一般黴菌感染療程至少為2週，視感染的程度、部位而定。(十一)請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。(十二)皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。(十三)小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。(十四)臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。(十五)瘡類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。

【用法用量】

取本劑適量塗擦於患部，不超過一天2次，早晚各塗敷1次。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張。
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)、繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(一)若有上述外之其他不適情況產生。(二)自覺狀況沒有改善或更惡化。
(三)一般黴菌治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4週，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。如即使若症狀改善停藥後，病情復發亦應立即就醫。

【包裝】 1000公克以下塑膠瓶裝、鋁軟管裝

【儲存條件】 25°C以下避光儲存

【類別】 醫師藥劑生指示藥品

委託者：



興中美生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區瑞光路618號5樓之1 電話:02-87513383

製造廠：



中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰德路106號 諮詢專線:04-7524166
http://www.chungmei.com.tw