

外用抗黴菌製劑
"中美" **化黴乳膏**
Anti-fungus Cream "C.M."

衛署藥製字第046481號

化黴乳膏是抗黴菌藥，內含有效成分Terbinafine在低濃度時，具有殺黴菌之作用，使黴菌細胞死亡，適合外用於各種皮膚表淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。

Terbinafine不會影響荷爾蒙或其他藥物代謝，交互作用少，且根據文獻，本藥外用體內吸收量低，全身性副作用發生率低，安全有效。

【成分】有效成分及含量：(Each gm Contains)

Terbinafine Hydrochloride10 mg

其他成分(賦形劑)：Cream Base Wax N-80、Propylene Glycol、Isopropyl Myristate、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Glycerol Monostearate、Lanolin Anhydrous、Butylated Hydroxyanisole、Silicon Oil、Menthol、Purified Water

【用途(適應症)】治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、體癬、股癬、汗斑。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (一)12歲以下。
 - (二)有深部皮膚組織感染。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：
 - (一)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二)正在接受醫師治療。
 - (三)患部在臉上。
 - (四)患部化膿。
- 四、其他使用上注意事項
 - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二)避免陽光直射。
 - (三)勿超過建議使用量或使用次數。
 - (四)使用部位或其周圍髒汗時，請洗乾淨後再用藥。

- (五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
- (六)本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，濕疹、浸潤、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。
- (七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
- (八)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
- (九)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
- (十)一般黴菌感染療程至少為2週，視感染的程度、部位而定。使用本藥須完成全部療程。

【用法用量】

1天1次	足癬、體癬、股癬
1天1至2次	汗斑

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)若有上述外之其他不適情況產生。
- (二)自覺狀況沒有改善或更惡化。
- (三)一般黴菌治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4週，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。如即使若症狀改善停藥後，病情復發亦應立即就醫。

【包裝】1000公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝

【類別】醫師藥劑生指示藥品

【儲存條件】請保存於25°C以下避光儲存

委託者：



製造廠：

