

外用鎮痛止癢劑

"中美" **舒癢軟膏**[®]

Shu Yang Ointment "C.M."

衛署成製字第001965號

本劑係以水楊酸甲酯 (Methyl Salicylate) 為主要成分，具有滲透性及吸收性，一經塗擦於患部即可由皮膚表面透達肌肉深部，而發揮其消炎鎮痛作用。且使血液循環旺盛，迅速解除筋骨疲勞疼痛，緩和肌肉與神經之炎症。

本劑在開始運動之前，塗擦於肩、腕、背、腳等肌肉部分，不但可使肌肉柔軟舒適，且有芳香清涼感，使身體適於活動。又於激烈運動或激烈操作後，將本劑塗擦於疲勞部分，即能除去肌肉之疲勞與疼痛，恢復正常。

【成分】

有效成分及含量 (Each gm Contains) :

Methyl Salicylate	110mg
Menthol	50mg
Camphor	50mg

其他成分 (賦形劑) : Stearyl Alcohol、Stearic Acid、Cetyl Alcohol、Cetyl Ether、Nikkol、Monoethanolamine、Isopropyl Myristate、Purified Water

【用途 (適應症)】

運動前後之肌肉疲勞、頭痛、凍傷、蚊蟲咬傷、神經痛、皮膚搔癢症。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
 - 曾因本藥成分引起過敏。
 - 2歲以下兒童
 - 曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象者
- 有下列情形者，請洽醫師診治：
 - 3歲以下。
 - 有深部皮膚組織感染。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - 要使用於臉部。
- 其他使用上注意事項
 - 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - 避免陽光直射。

- 勿超過建議使用量或使用次數。
- 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
- 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
- 本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部
- 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。
- 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
- 本藥不可連續使用超過7天。
- 避免觸碰衣物、塑膠品、木材、金屬。
- 不可長期大面積使用(以超過使用者的兩手掌面積為參考)，以免引起水楊酸中毒症狀，如呼吸困難、發汗、體溫過高、面色潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續頭痛，使用前請諮詢醫師或藥師。
- 使用後請將封口蓋閉緊，以防藥氣外溢。

【用法用量】

一日數回，塗擦於患部，並做適度之按摩，入浴後使用效果更好。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	紅斑、搔癢、刺痛感
其他	水楊酸效應 (耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等)

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 (一) 若有上述外之其他不適情況產生。
 (二) 使用7天後自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】100公克以下鋁軟管裝、瓶裝

【類別】成藥

委託者：

 **興中美生技有限公司**
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區瑞光路618號5樓之1 電話:02-87513383

製造廠：

 **中美兄弟製藥股份有限公司**
PIC/S GMP 藥廠
彰化市彰南路106號 諮詢專線: 04-7524166
http://www.chungmei.com.tw