

疱疹治療劑

"中美"

舒疱疹藥

檸檬口味

乳膏 5% (艾賽可威)

SUPOLA Cream "C.M." 5% (Acyclovir)

衛署藥製字第037832號

舒疱疹藥係為最新對抗疱疹濾過性病毒藥物，可有效使用於皮膚治療各類疱疹(包括生殖器疱疹、帶狀疱疹、唇疱疹及黏膜皮膚疱疹)因對疱疹病毒具選擇抑制作用，毒性低安全性高。

【產品說明】本品為一白色乳膏，主要含抗病毒劑 Acyclovir (5% w/w)。Acyclovir 可治療唇邊出現之唇疱疹，臨床實驗證明，早期治療可及時停止唇疱疹的再發生，如果唇疱疹已經發生，使用 Acyclovir 可加速癒合。本品為醫師藥師藥劑生指示藥品，為讓您了解唇疱疹形成原因及正確使用 Acyclovir，請詳讀本仿單。

【成分】有效成分及含量：(Each gm contains)

Acyclovir50mg

其他成分(賦形劑)：Cream Base Wax N-80、Propylene Glycol、Isopropyl Myristate、Propyl Paraben、Transcutol、Polyoxyl 40 Stearate、Cetyl Palmitate、Butylated Hydroxyanisole、Methyl Paraben、Green Tea E9901004、Lemon Essence、Purified Water

【用途(適應症)】唇疱疹。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 - (一)曾因本藥成分引起過敏。
 - (二)如果因免疫系統能力降低而正在醫師觀察之下。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (一)深部皮膚組織感染。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (一)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項
 - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二)避免陽光直射。
 - (三)勿超過建議使用量或使用次數。
 - (四)使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
 - (五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 - (六)本藥只可使用在嘴唇及臉部，如果不確定是否為唇疱疹請向醫師諮詢，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。
 - (七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
 - (八)使用後請保持使用部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
 - (九)至少使用5天來治療唇疱疹，使其快速復原。
 - (十)僅可個人使用，不可提供給他人具有相同症狀者使用。

(十一)包裝內之乳膏可足夠使用水泡一次發作。當唇疱疹一開始出現時，就應該開始使用。在刺痛情形開始時使用 Acyclovir 乳膏，可能可以阻止唇疱疹的出現。如果唇疱疹已經出現水泡，使用 Acyclovir 乳膏可加速癒合。

【用法用量】

使用方法	1、將乳膏塗抹於整個患部及周圍。
	2、每4小時使用一次，一天使用5次，如果忘記使用時，儘快塗抹之，然後繼續使用。
	3、連續使用5天，如果唇疱疹5天內沒有痊癒，可再持續使用5天，使用10天之後，唇疱疹仍未痊癒或變得更加嚴重，請向醫師請教。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	暫時性的灼痛或刺痛，此現象會迅速消失，偶有紅疹、發癢或皮膚輕微乾裂及剝落現象，若以上症狀持續或惡化

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(一)若有上述外任何不適情況產生。(二)自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】1000公克以下鋁軟管裝

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存條件】25°C 以下避光儲存

【有關疱疹】唇疱疹是由單純性疱疹病毒(HSV)所引起，此病毒平常潛伏於與嘴唇及週遭皮膚有關的神經細胞，此病毒不同於造成生殖器疱疹的病毒。

- 第一次發作時間：初次通常發生於兒童期，可能是因為遭受帶原者親吻而感染，病毒會經由皮膚、神經而達到神經結並停留於此。
- 發作的誘因：與病毒有關之病症，例如一般感冒、流行性感冒、疲勞、情緒低落、壓力、肉體創傷、曬傷或甚至只是覺得“沒有精神”，一旦誘發，病毒會返回神經至皮膚，到達嘴唇周邊，導致唇疱疹產生。

【謹記：唇疱疹具有感染性】

此病毒可以傳染至身體其他部位，為減少產生感染的危險性，不要讓他人觸碰您的唇疱疹或與他人共用毛巾…等。

如果您或您的伴侶為唇疱疹帶原者，應避免親吻及口交。此外，在碰觸唇疱疹之前及之後，請務必清洗您的雙手。

*避免接觸眼睛，眼部的HSV感染會造成角膜之潰瘍。

*當您有唇疱疹時，避免親吻，尤其是對兒童。

*避免刺激唇疱疹及結痂，因為這種行為不僅可能使您的唇疱疹遭受其他病菌感染，也

可能使您的指頭遭受感染。

*避免與他人共用飲食器具。

委託者：



興中美生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區瑞光路618號5樓之1 電話:02-87513383

製造廠：



PIC/S GMP 藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰德路106號 總機專線: 04-7524166
http://www.chungmei.com.tw