

# "中美"舒胃因錠

## Swellin Tablet "c.m."

衛署藥製字第043010號

### 【本藥特色】

制酸劑配合局部麻醉劑Oxethazaine，可緩解胃部灼熱感及疼痛且與Magnesium Carbonate配伍可降低便秘情況。

### 【成分】有效成分及含量：(Each Tablet Contains)

Oxethazaine.....5mg  
 Aluminum Hydroxide Dried Gel.....125mg  
 Magnesium Carbonate.....84mg

其他成分(賦形劑)：PVP K-90、Lactose、Magnesium Stearate、Potato Starch、Sodium Starch Glycolate、Glyceryl Behenate、Tartrazine

### 【用途(適應症)】

胃炎、腸炎、食道炎所伴隨之胃痛、胃酸過多、胃部不適或灼熱感。

### 【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
  - (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - (一) 12歲以下。
  - (二) 消化道潰瘍的人。
  - (三) 有腎臟疾病的人。
  - (四) 腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  - (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (二) 與其他藥品併用時。
- 四、其他使用上注意事項
  - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (二) 避免陽光直射。
  - (三) 勿超過建議使用量。

(四) 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

(五) 服用過量，有些病人可能有暈眩昏厥，嗜睡的情形。

### 【用法用量】

成人及12歲以上	一天3至4次，每次2錠
12歲以下	請洽醫師診治

### 【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

身體部位	副作用
其他過敏反應	偶有過敏(皮膚發疹、搔癢症、舌炎、血管水腫)

(一) 若有任何不適情況產生。

(二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】12-1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存條件】25°C以下避光儲存

委託者：

 **興中美生技有限公司**  
 Sino Advance Biotech Co., Ltd.  
 台北市內湖區瑞光路618號5樓之1 電話:02-87513383

製造廠：



PIC/S GMP藥廠

**中美兄弟製藥股份有限公司**  
 彰化市彰鹿路106號 諮詢專線: 04-7524166  
<http://www.chungmei.com.tw>