

廣效性抗黴菌製劑

**賀爾爽<sup>®</sup>**外用液 1%(克氯黴唑)**HORSON<sup>®</sup> TOPICAL SOLUTION 1%(Clotrimazole)**

衛署藥製字第029469號

賀爾爽含Clotrimazole係一廣效性抗黴菌製劑，對於皮膚病及以下原因引起之皮膚感染有效：酵母菌、糠秕疹小芽胞菌、念珠菌。

**【藥理作用】**

- 1.Clotrimazole可改變黴菌細胞膜之通透性，破壞細胞內之核酸，而具制菌及殺菌作用。
- 2.體表投藥後，作用於皮膚角質層而產生抗菌作用。
- 3.對皮膚真菌、酵母菌、黴菌及其他各類黴菌所引起之皮膚黴菌病、汗斑、各類體癬，均有殺菌之治療效果。

**【成分】有效成分及含量：(Each ml contains)****Clotrimazole.....10 mg**

其他成分(賦形劑)：Ethanol、Isopropyl Alcohol、Menthol、Butyl Paraben、  
Tween 80、Propylene Glycol、Isopropyl Myristate、Jasmin、  
Essence、Purified Water

**【用途(適應症)】**治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬(香港腳)、股癬、汗斑。

**【使用上注意事項】**

- 一、有下列情形者，請勿使用：
  - (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
  - (二) 2歲以下之兒童。
- 二、有下列情形者，請洽醫師診治：
  - (一) 深部皮膚組織感染。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  - (一) 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項
  - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (二) 避免陽光直射。
  - (三) 勿超過建議使用量。
  - (四) 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
  - (五) 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。
  - (六) 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
  - (七) 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
  - (八) 黴菌治療至少二星期，使用本藥須完成全程療程。

**【用法用量】**每日2次，均勻噴灑於患部，兒童不宜使用。

**【警語】**

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎；如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 自覺狀況沒有改善或更惡化。
- (三) 經治療後，一般黴菌一星期、股癬和體癬二星期、足癬四星期症狀會改善，若症狀沒有改善，或症狀有改善，但停藥後病情又復發。

**【類別】** 醫師藥師藥劑生指示藥品。

**【包裝】** 4000毫升以下鋁瓶裝。

委託者：

**興中美生技有限公司**  
Sino Advance Biotech Co., Ltd.  
台北市內湖區基湖路35巷6號5F 電話: 02-87513383

製造廠：



PIC/S GMP廠

**中美兄弟製藥股份有限公司**

彰化市彰德路106號 諮詢專線: 04-7524166

http://www.chungmei.com.tw