

愛潔膚乳膏[®] 1毫克/公克(瑞姆羅)

Airful[®] Cream 1mg/gm (Tretinoin)

衛署藥製字第028021號

懷孕：

- 1.可能懷孕婦女、孕婦使用前請洽醫師診治，因本藥於懷孕期間使用的安全性及有效性尚未確立。
- 2.育齡婦女使用期間應採必要的避孕措施。
- 3.因依據動物研究顯示含retinoids類口服劑藥品用於懷孕婦女可能會導致胎兒具有先天性異常之風險，雖依目前臨床文獻資料，若依照仿單建議用法用量，外用劑型retinoids類藥品，因經皮吸收量微小，並未有明確證據顯示對於胎兒健康有害，但仍應經過審慎評估後使用。

青春期的尋常性痤瘡(面皰、青春痘)，是最令人煩惱的皮膚疾患，往往因情況嚴重持久，不敢面對社交活動，成為悶悶不樂的來源，愛潔膚乳膏是針對克服上項疾患的治療藥劑。

最近臨床研究證明，面皰形成的早期變化是毛囊上皮細胞形成角化層，皮脂孔阻塞，無法將過多的油脂分泌排出所致，愛潔膚乳膏可刺激上皮細胞減少形成角化層，使其容易剝落，油脂能順利分泌出，達成治療面皰、青春痘的優異療效。

藥理作用及特點：1.本藥有軟化並脫去面皰粗糙表皮作用。2.促進表皮細胞分裂活動的正常，抑制面皰形成。3.侵入面皰周圍的厚壁解除角化層，消除面皰。4.本藥療效可深入皮膚深處。

【成分】有效成分及含量：(Each gm contains)

Tretinoin.....1mg

其他成分(賦形劑)：Isopropyl Myristate、Cream Base Wax、Stearyl Alcohol、Methyl Paraben、Propylene Glycol、Butylated Hydroxyanisole、Propyl Paraben、Purified Water

【用途(適應症)】

尋常性痤瘡(面皰)皮膚角質化

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：(一)曾因本藥成分引起過敏。
- 二、有下列情形者，請洽醫師診治：(一)有深部皮膚組織感染。(二)12歲以下。(三)可能懷孕婦女、孕婦。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑劑生：(一)哺乳婦。(二)正在使用其他外用痤瘡(青春痘、面皰)治療藥物或併用其他痤瘡輔助治療。
- 四、其他使用上注意事項：(一)為防止兒童誤食請妥善保管。(二)避免陽光直射。(三)勿超過建議使用量或使用次數。(四)使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。(五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。(六)本藥僅能使用於痤瘡(面皰、青春痘)部位，不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。(七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。(八)本藥勿使用於有損傷的皮膚及大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)。(九)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。(十)使用前請使用於1-2個小區域，測試是否會對本藥過敏，若無刺激感發生，再使用本藥。(十一)使用期間避免日光照射，必要時可塗抹防曬產品或以衣物局部保護之。如有皮膚曬斑，請於恢復後方可使用本藥。(十二)如使用皮膚脫皮劑，請於作用消失後方可使用本藥。(十三)天氣冷、風吹會增加本藥之刺激性，請避免之。(十四)本藥會增加皮膚濕疹者之敏感度，請注意之。(十五)藥皂，含藥洗潔劑，肥皂，有乾燥作用之化粧品，酒精含量高的產品，收斂劑、香料、石灰可能與Tretinoin產生作用，請注意之。

【用法用量】

成人及12歲以上	一般一天一次(睡前)或二次(早晚)塗勻一薄層於清洗後之患處，每日使用次數可依皮膚反應病況而定
12歲以下	請洽醫師診治

【警語】

- 一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑劑生：

身體部位	副作用
皮膚	引起局部紅腫及脫皮現象、偶有短暫性過高或過低色素沉著

- 二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有上述外之其他不適情況產生。
- (二) 同一部位使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。
- (三) 皮膚發生乾燥、脫皮、刺痛、燒灼感時，經降低使用次數或使用低濃度，刺激感未改善。

【包裝】 1000公克以下鉸軟管裝、塑膠瓶裝**【類別】** 醫師藥師藥劑生指示藥品

委託者：

興中美生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區瑞光路618號5樓之1 電話:02-87513383

製造廠：



PIC/S GMP 廠

中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線：04-7524166

http://www.chungmei.com.tw