

副腎皮質荷爾蒙製劑
"中美" 膚娜[®] 乳膏
HOH NA[®] Cream "C.M."

衛署藥製字第013538號

【藥理作用】

本藥的主要成分Fluocinolone Acetonide是一種外用強效的副腎皮質荷爾蒙劑(類固醇的一種),局部使用時可以發揮強力的消炎及抗過敏作用,對於各種皮膚的搔癢發炎、過敏症狀具有緩解的效果。

【成分】有效成分及含量: (Each gm Contains)

Neomycin Sulfate.....3.5mg(Potency)

Fluocinolone Acetonide0.25mg

其他成分(賦形劑): Glyceryl Monostearate、Isopropyl Myristate、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Butylated Hydroxyanisole、Silicon Oil、Fragrance Compound (Rose)、Propylene Glycol、Purified Water、Cetyl Alcohol、Stearic Acid、Cream Base Wax N-80、Stearyl Alcohol

【用途(適應症)】急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染,濕疹或皮膚炎。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者,請勿使用:曾因本藥成分引起過過敏。
- 二、有下列情形者,使用前請洽醫師診治:
 - (一) 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷,嚴重燒燙傷。(二) 3歲以下。
- 三、有下列情形者,使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:
 - (一) 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。(二) 要使用於臉部。
- 四、其他使用上注意事項
 - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。(二) 避免陽光直射。(三) 勿超過建議使用量。
 - (四) 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後,再戴隱形眼鏡。(五) 本藥限於皮膚外用不得內服,亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等),潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。(六) 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或(皮膚深部感染)。(七) 使用後請保持塗抹部位透氣,勿密封,以免增加副作用。(八) 長期使用有可能引起繼發性感染。(九) 會使衣物染色。(十) 類固醇抗發炎劑不可連續使用超過7天。(十一) 皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分,誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。(十二) 小孩長期使用類固醇較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。(十三) 臉部、腋部及鼠蹊部,若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。(十四) 使用部位或其周圍出汗時,請洗乾淨後再用藥。(十五) 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。(十六) 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛,請立刻以水或溫水沖洗,並立刻前往眼科就醫。(十七) 請勿使用在患部以外,也勿當作預防使用。

【用法用量】一天2~4次,塗於患部。

【警語】

一、使用本藥後,若有發生以下副作用,請立即停止使用,並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生:

身體部位	副作用
皮膚	過敏性皮膚炎、繼發性感染、搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痂子、毛細管擴張。
耳朵	耳毒性
腎臟	腎毒性
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

二、使用本藥後,若有發生以下症狀時,請立即停止使用,並接受醫師診治:

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 使用7天後,自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】100公克以下鋁軟管裝、500公克罐裝

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存條件】25°C以下避光儲存

委託者:

 興中美生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區瑞光路618號5樓之1 電話:02-87513383

製造廠:



PIC/S GMP藥廠

中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線: 04-7524166

http://www.chungmei.com.tw