

副腎皮質荷爾蒙·新徽素製劑

"中美"

**膚寧通藥膏**

FRADIOCORT Cream "C.M."

衛署藥製字第007821號

"中美" 膚寧通藥膏含有類固醇Triamcinolone Acetonide用於治療皮膚病，另含有Neomycin Sulfate，為一種對革蘭氏陽性、陰性及耐酸性細菌具有廣效之抗生素，可殺滅侵入皮膚組織之細菌。

**【成分】 Each gm Contains :**

Triamcinolone Acetonide.....1mg  
 Neomycin Sulfate.....5mg(eq. to Neomycin 3.5mg)  
 Cream Base Wax No.80、Glyceryl Monostearate、Propylene Glycol、  
 Isopropyl Myristate、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Butylated  
 Hydroxyanisole、Silicon Oil、Cetyl Alcohol、Stearic Acid、  
 Bouquet(AT 60562 Flavour)、Stearyl Alcohol、Purified Water

**【適應症】** 過敏性皮膚炎、皮脂溢性皮膚炎、異位皮膚炎、接觸性皮膚炎、濕疹、錢幣形濕疹、紅皮症、濕疹性牛皮症及外耳炎。

**【用法用量】** 直接塗擦於洗淨之患部，一日3-4次。

本藥須由醫師處方使用。

**【注意事項】**

- 1.原則上確認其對細菌之感受性再使用，防止耐性菌之產生，在最短期間及治療上之最小劑量達到治療之目的。
- 2.一般注意事項：
  - a/罕有搔癢、發紅、腫脹、丘疹，小水泡等過敏現象，若發生此現象應立即停止使用。
  - b/廣範圍之燙傷、潰瘍之皮膚避免長時間連續使用。
- 3.若未達療效時應配合或改用其他抗菌劑或抗真菌劑。
- 4.大量或長期廣範圍之密封法(ODT)使用時，與副腎皮質全身投與有相同之副作用。
- 5.禁忌：
  - a/對Streptomycin, Kanamycin, Gentamycin, Neomycin等之胺基糖苷類抗生素過敏者。
  - b/皮膚結核、單純疱疹、水痘、帶狀疱疹、種痘疹。
  - c/對Triamcinolone過敏者。
  - d/有鼓膜穿孔之濕疹性外耳道炎。
  - e/潰瘍、第二度以上燙傷、凍傷。

**6.副作用：**

- a/為考慮對腎臟及聽覺神經之副作用，避免長期使用。
  - b/皮膚之感染症：皮膚真菌性(念珠菌症、白癬等)及細菌性(傳染性膿痂疹、毛囊炎等)感染症產生時(密封法(ODT)之治療最易引起)，應適當併用其他抗真菌劑、抗菌劑，如果症狀未見迅速改善時應停止使用。
  - c/其他之皮膚症狀：長期連續使用，副腎皮質性痤瘡(尋常性痤瘡相似之白色面皰有發生之傾向)，副腎皮質性酒皰及口周圍炎(口周圍、罕有顏面紅斑、丘疹、毛細血管擴張、痂皮、鱗屑生成)、副腎皮質性皮膚(皮膚萎縮、毛細血管擴張) 很少有魚鱗癬樣皮膚變化紫斑，多毛及色素脫失之現象，如有此情形發生時應改用不含副腎皮質之藥劑。
  - d/過敏性：罕有皮膚之刺激、發疹等現象，如有發生時應停止使用。
  - e/腦下垂體、副腎皮質系機能：大量或長期廣範圍之密封法(ODT)使用，對腦下垂體、副腎皮質系機能會有抑制應注意。
  - f/眼：眼瞼皮膚，使用時應注意眼壓增高及綠內障之產生，大量或長期廣範圍使用密封法(ODT)治療時應注意白內障及綠內障。
  - g/孕婦之使用：孕婦使用之安全性未建立，對於孕婦或可能懷孕之婦人避免長期大量使用。
  - h/乳幼兒之使用：長期連續使用恐對發育會有所影響。
- 7.高齡者因生理機能衰退應小心使用。
  - 8.使用上注意，不可使用於眼科。
  - 9.應保存於室溫陰涼處。

**【包裝】**：100gm以下軟管裝；500gm罐裝

委託者：



製造廠：

