

鼻用噴液劑
 "中美" **鼻那通** 噴鼻液 0.1%(奧每達佐林)
 BERTON Nasal Spray 0.1%(Oxymetazoline) "C.M."

衛署藥製字第038772號

【作用】本藥具擬似交感神經作用，對鼻道的微小動脈有收縮作用，亦有速效長效作用，有抗鼻黏膜充血之效果。

【成分】有效成分及含量：(Each ml Contains)

Oxymetazoline HCl..... 1mg

其他成分(賦形劑)：Benzalkonium Chloride、Camphor、Eucalyptus Oil、Hydroxypropyl Methylcellulose、Sodium Chloride、Sodium Phosphate Monobasic、Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous、Alcohol、Propylene Glycol、Mint Flavor、Purified Water

【用途(適應症)】消除鼻黏膜充血，黏膜炎腫，抑制鼻液分泌過多，鼻竇炎，乾草熱及呼吸道過敏。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(一) 未滿12歲。(二) 有心臟疾病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、青光眼或因攝護腺肥大造成排尿困難的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：
 - (一) 正在接受醫師治療的人。
 - (二) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (三) 正在使用含鼻充血解除成分之藥品，如綜合感冒、鼻炎或抗過敏等藥品。
- 四、其他使用上注意事項：(一) 為防止兒童誤用請妥善保管。(二) 避免陽光直射。(三) 勿超過建議使用量或使用次數。(四) 請勿連續使用本藥超過3天。過度頻繁使用或延長使用可能會造成再度鼻塞或鼻塞惡化。(五) 為避免交互感染，請勿與他人共用。(六) 本藥使用後可能會對鼻腔造成暫時的不適感，如乾燥、灼熱、刺痛、打噴嚏、或鼻分泌物增加。(七) 使用前，請先擤鼻涕。

【用法用量】 成人 一天2次，每次於鼻腔內噴2~3下，每次需間隔10~12小時

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、發癢
鼻腔	腫脹、刺激感

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有上述外之其他不適情況產生。
- (二) 若持續鼻塞，或連續使用3天後症狀未改善或更惡化。

【包裝】4000ml以下塑膠瓶裝、玻璃瓶裝

【特點】本藥之主要成分Oxymetazoline Hydrochloride是一種長效型解鼻充血劑，對於藥效及使用方面，除了一般噴鼻劑之特性外，其最大特點是使用一次藥效可持續12小時。

【類別】醫師藥劑生指示藥品

【儲存條件】25°C以下避光儲存

委託者：

 **興中美生技有限公司**
 Sino Advance Biotech Co., Ltd.
 台北市內湖區瑞光路618號二樓之1 電話:02-87513383

製造廠：



PIC/S GMP藥廠

中美兄弟製藥股份有限公司
 彰化市彰南路106號 服務專線：04-7524166
<http://www.chungmei.com.tw>