

疤膚力[®]軟膏

SCARFREELY[®]Ointment

衛署藥製字第032341號

本品係由特殊成分Acexamic Acid配合廣效殺菌劑Neomycin Sulfate，二者以適當含量配合協同發揮極佳抗感染及抗疤之特殊療效，經臨床使用證明，對皮膚創傷及頑固性潰瘍等症狀，確實有效。

【成分】每gm含

主成分：

Acexamic Acid.....50mg

Neomycin(as Sulfate).....4mg(Potency)

賦形劑：

Cream Base Wax No.80、Propylene Glycol、Sorbic Acid、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Glyceryl Monostearate、Lanolin Anhydrous、Isopropyl Myristate、Mint Flavor、Purified Water

【藥理作用及特點】

- 1.促使膠原纖維合成規律化，避免發炎的鄰近組織產生不正常的黏連，而造成肥腫或癭瘤現象。
- 2.可促進患部產生優良性質的結締組織層，並適當調整細胞的生理活性利於上皮形成，加速傷口癒合及組織修復。
- 3.具有使傷口疤痕柔軟作用，促進表皮外形之平整化，縮短結痂時間，並提供良好的結膜底層，便利皮膚移植。
- 4.具廣效殺菌效果，在皮膚上能發揮持久的保護功能，並預防重覆感染之危險性。

【適應症】燙傷、疤痕、癭管性骨炎、潰瘍性褥瘡及靜脈曲張，預防外傷及手術後傷口癒合後引起之皮膚萎縮及癭瘤。

【用法用量】取適量塗佈患部使用，使用前請先將傷口或潰瘍面加以消毒清潔，於塗佈後以紗布包紮覆蓋，使用次數，視患部情況而定。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 1.下列患者請遵從醫師指示小心用藥：
嚴重腎疾患、靜脈腫瘤、燙傷引起之水泡、正在流膿之傷口。
- 2.授乳婦不得塗於乳房，以免嬰兒吸食。
- 3.本品不適用於嬰兒皮膚更新及大片傷口上；且為避免抗藥性產生。治療期以一星期為佳。
- 4.曾對下列藥物有過敏者，宜慎重使用：
Streptomycin. Kanamycin. Neomycin. Gentamycin.
- 5.副作用：偶有發疹、搔癢、腫脹、小水泡等不適現象發生。

【包裝】100公克以下塑膠瓶裝、鋁軟管裝

委託者：



製造廠：



PIC/S GMP藥廠