

# 旅佳<sup>®</sup>錠

## LIGA<sup>®</sup>Tablets

內衛藥製字第002347號

乘坐舟車或飛機旅行，由於身體顛簸搖擺不定，平衡系統受擾亂，因而引起眩暈，或甚至於有噁心及嘔吐等症狀，均可用旅佳錠事前加以防止或及時予以緩解，旅佳錠之主要作用在調節中樞神經機能，尤其是平衡中樞迷路前庭及腦神經等，有使其過度興奮平緩之功效。

【成分】每錠含：Meclizine Hydrochloride.....25mg  
Corn Starch、Lactose、Magnesium Stearate、Avicel、Talc、Tartrazine、Cellkol、Povidone

【適應症】預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

【用法用量】預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前30~60分鐘服用之。成人1次1錠，一天服用1次，12歲以上適用成人劑量；12歲以下之兒童，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

### 【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦、可能懷孕婦女及授乳婦女不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 五、不得併服含酒精飲料。
- 六、服用本藥若有不了解之處，請洽詢醫師藥師藥劑生。

### 【警語】

- 一、服用本藥後，可能引起思睡、倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應(以幼兒及老年人較常見)，老年人應小心使用本藥，如症狀持續加強，宜停藥就醫。
- 二、除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
  - (一)曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。
  - (二)12歲以下不建議自行使用。
- 四、下列病患使用鎮暈藥前，應詢問醫師藥師藥劑生：
  - (一)接受醫師治療並服用藥物者。
  - (二)大於65歲以上者。
  - (三)本人或家族具有過敏體質者。
- 五、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺功能亢進，腎臟病者不得服用。
- 六、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑、安眠劑及其他含有抗組織胺成分之內服劑(如其他鎮暈藥、綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等)。
- 七、如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難，請勿服用此藥。
- 八、服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。
- 九、如發生皮膚發疹、發紅、癢疹、頭痛、臉紅、心悸、排尿困難、暈眩、浮動、不安定感、口乾、便秘及下痢等症狀時，請停止服用，並持藥品包裝及說明書，詢問醫師藥師藥劑生。

【包裝】1,000錠以下塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

【儲存條件】25℃以下避光儲存。



PIC/S GMP藥廠

中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線:04-7524166

健康訊息請參閱網站 <http://www.健康之道.tw>