

非比林系解熱鎮痛劑

"中美"舒痛佳錠 Shu Tong Jia Tablets "C.M."

衛署藥製字第021806號

"中美"舒痛佳錠，為非比林系、非麻醉性，且無習慣性之高安全性的解熱鎮痛劑產品。
"中美"舒痛佳錠主成分Ethyoxbenzamide及Acetaminophen均為效力強、並具持續性作用之解熱鎮痛劑，服用後能迅速發揮解熱鎮痛效果，尤Ethyoxbenzamide對於生理上各種疼痛具有良效，且其因配合Acetaminophen更具有相乘之效果而發揮良好鎮痛效用；本品另添加作用溫和的皮質性神經鎮痛劑Bromvalerylurea而更能增強其鎮痛效果，故而"中美"舒痛佳錠實為一具有持續性強效鎮痛作用成分的產品。

【作用】

1.Ethyoxbenzamide：

為水楊酸類衍生物成分，能經由抑制前列腺素合成而產生消炎及止痛效果，亦能使末梢血管擴張而降低體溫、解熱鎮痛效力強且持久的優良鎮痛解熱效用。

2.Acetaminophen：

Acetaminophen胃腸吸收良好，迅速達到最高血中濃度，進而發揮優異解熱、鎮痛效果。Acetaminophen成分除易排泄、殆無積蓄毒性、安全性高外，與Ethyoxbenzamide、Bromvalerylurea及Caffeine合併使用時，止痛療效更為顯著。

3.Bromvalerylurea：

與鎮痛劑成分併用時可增強鎮痛效果。

4.Caffeine anhydrous：

Caffeine具備腦部血管擴張、血液流通作用，而可消除頭痛。

【成分】每錠中含：

Ethyoxbenzamide.....	200mg	Bromvalerylurea.....	100mg
Acetaminophen.....	80mg	Caffeine anhydrous.....	25mg
Magnesium Stearate、Cellkol-P.V.P.K. #30、Sodium Lauryl Sulfate、Stearic Acid、Sodium Starch Glycolate、Compritol(888ATO)			

【適應症】解熱、鎮痛(月經痛、頭痛、神經痛、牙痛、腰痛、外傷痛、肌肉痛、關節痛、骨折痛、咽喉痛)。

【用法用量】通常成人一次2粒，8~14歲每次一粒，每天3次，可依年齡、體重、症狀之差異而酌宜增減之。醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】1.本劑含有劇藥應切實按照所定服用方法及劑量使用。

2.在就診中尚使用其他解熱鎮痛或感冒藥劑者避免重複使用。

3.應用本劑數次仍未見症狀改善時，應即停用。

4.避免長期使用。

5.本劑應適用於小孩伸手不及處。

6.本藥含咖啡因類成分，應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張、興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

【酒精警語】

1.若你每天喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問你的醫師，你是否能服用Acetaminophen或其它鎮痛解熱劑，因為Acetaminophen可能造成肝損害。

2.本藥含acetaminophen(paracetamol)成分，應注意下列事項：

(1)肝otoxicity：

a.使用acetaminophen(paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。
大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000毫克的acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含acetaminophen成分之藥品。

b.過量服用acetaminophen可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有acetaminophen成分之藥品，因而造成用藥過量。
c.有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用acetaminophen期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有acetaminophen或paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有acetaminophen成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

(2)與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為acetaminophen可能造成肝損害。

慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用acetaminophen而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

(3)過量：

a.服用過量acetaminophen會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。

b.本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。

c.acetaminophen過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死、低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心、嘔吐、出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48~72小時才明顯可見。

(4)過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用acetaminophen相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對acetaminophen過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

(5)嚴重皮膚反應：使用acetaminophen的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性體胞病(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文生氏-強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome, SJS)和毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

【包裝】12~1000錠瓶裝、鋁箔盒裝。

【儲存條件】25°C以下室溫儲存、避免陽光直射。

委託者：



製造廠：



PIC/S GMP藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰鹿路106號
<http://www.chungmei.com.tw>
諮詢專線：04-7524166