

綜合感冒治療劑  
 “中美”  
**維生素感冒膠囊** 原味  
 VIT.ANTI-COLD Capsules “C.M.” 衛署藥製字第027066號

本藥係針對治療、緩解感冒症狀，配合各種成分，本劑含有解熱鎮痛劑、鎮咳祛痰、支氣管平滑肌弛緩劑、抗組織胺劑並配合維生素 B1、B2，補充感冒引起的虛弱體力。

## 【成分】

## 有效成分及含量：(Each capsule contains)

Acetaminophen.....	300mg
Chlorpheniramine Maleate.....	2.5mg
Dextromethorphan Hydrobromide.....	15mg
DL-Methylephedrine Hydrochloride.....	10mg
Potassium Guaiacolsulfonate.....	60mg
Caffeine Anhydrous.....	30mg
Thiamine Hydrochloride.....	8mg
Riboflavin.....	4mg

## 其他成分(賦形劑)：

Talc、Silicon Dioxide、Magnesium Stearate

Capsule成分：Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine、Sunset Yellow、FCF、New Coccin、Purified Water、Titanium Dioxide

## 【用途(適應症)】

感冒諸症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、喀痰、咳嗽、發熱、頭痛)之緩解。

## 【使用上注意事項】

## 一、有下列情形者，請勿使用：

- (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- (二) 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(SSRI)的人。

## 二、有下列情形者，請洽醫師診治：

- (一) 8歲以下。
- (二) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
- (三) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
- (四) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
- (五) 有心臟病及65歲以上的人。

## 二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- (三) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- (四) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- (五) 服用過量[每日超過Acetaminophen4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (六) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

## 【本藥成分作用及特長】

- 1.Acetaminophen：解熱、鎮痛效果很好，口服後迅速達到最高血中濃度，對於胃腸和血液方面的副作用較少。用於治療頭痛、發燒、神經痛、關節痛及各種感冒引起的疼痛。對於Pyrin(匹林)類藥品過敏的人可以使用。
- 2.Chlorpheniramine Maleate：為抗組織胺藥品中藥效較強，副作用較小者，對流鼻水、鼻塞、打噴嚏各種過敏性症狀的預防以及治療效果卓越。
- 3.Dextromethorphan Hydrobromide：為一非麻醉性止咳藥，止咳效果是Codeine的1.5倍，而且較不容易產生習慣性，針對咳嗽中樞直接作用，所以止咳效果很好，而且較無胃腸方面的副作用。
- 4.DL-Methylephedrine Hydrochloride：可鬆弛擴張支氣管平滑肌，治療感冒支氣管炎所引起的咳嗽、支氣管氣喘、鼻炎等。
- 5.Potassium Guaiacol Sulfonate：是祛痰藥品，能增加氣管內分泌物的排除。
- 6.Caffeine Anhydrous：可短期促進腦血管循環，減少感冒引起的昏睡、倦怠感。
- 7.Thiamine Hydrochloride(維生素B1)及Riboflavin(維生素B2)：都是營養素，可增加身體對感冒的抵抗力，協同上列治療成份，發揮治療感冒諸症狀的效果。

【包裝】6-1000粒盒裝、塑膠瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存條件】25℃以下儲存、避免陽光直射。

## 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
- (三) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
- (四) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

## 四、其他使用上注意事項

- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二) 避免陽光直射。
- (三) 勿超過建議使用量。
- (四) 不要服用本藥超過七日。
- (五) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
- (六) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen(Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
- (七) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
- (八) 不得與酒精性飲料併用。
- (九) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心悸過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

## 【用法用量】

成人及14歲以上	一日3次，每次1粒。飯後30分鐘內服用。
8歲以上未滿14歲	一日3次，每次半粒。飯後30分鐘內服用。
8歲以下	請洽醫師診治。

## 【警語】

## 一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

委託者：

**興中美** 生技有限公司  
 Sino Advance Biotech Co., Ltd.  
 台北市內湖區基湖路35巷6號5F

製造廠：

PIC/S GMP藥廠  
**中美兄弟製藥股份有限公司**  
 彰化市彰鹿路106號 諮詢專線：04-7524166  
 http://www.chungmei.com.tw