

降壓劑

"中美" 血平佳[®]錠 Shpynja[®] Tablets "C.M."

衛署藥製字第029804號 G.M.P. G-0696

【成分】每錠含：

Atenolol.....100mg
Chlorthalidone.....25mg
Silicon Dioxide、Mannitol、Polyplasdone XL、
Polyvinylpyrrolidone S630、Sodium Lauryl Sulfate、
Talc、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate、
Food Color Yellow No.4

【藥理作用】

- (一) Atenolol為心臟選擇性β-阻斷劑，Chlorthalidone為利尿劑，兩者併用可有效控制高血壓。
- (二) Atenolol：
- 1.降低反射性之立直性心跳快速。
 - 2.延長Sinus cycle及靜脈竇結(Sinusnode)之恢復時間。
 - 3.延長房室結之傳導時間。
 - 4.降低休息及運動時之心跳速率。
 - 5.降低休息及運動時之心收縮壓及舒張壓。
 - 6.抑制isoproterenol所產生之心跳快速。
 - 7.Catecholamines之競爭性阻斷劑降低心輸出量。
 - 8.抑制renin之活性。
- (三) Chlorthalidone：作用於腎元亨利氏管上行枝之皮質段，大量增加Na.Cl之排出產生利尿作用。

【適應症】高血壓。

【用法用量】成人：每日服用一錠，必要時可與其他抗高血壓藥物併用。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 1.患有充血性心衰竭之高血壓病人，同時服用digitalis和利尿劑時，應小心服用本品，必要時停藥。
- 2.腎功能不全者應小心服用本品，腎臟病患者服用thiazides會產生氮血症，在服用本品期間，得知腎功能不全，應立即停藥。
- 3.肝功能不全、肝病者服用本品可能會產生肝性昏迷(hepatic coma)應小心使用。
- 4.手術麻醉前48小時應停藥。
- 5.作副甲狀腺功能檢查時，須停藥。
- 6.β-接受體阻斷效果會被dobutamine和isoproterenol所抑制。
- 7.避免和Lithium併用，因為腎之廓清率會降低而升高Lithium之毒性。
- 8.同時服用本品和Clonidine，欲停藥時不可同時停藥，應先停止服用本品數天，再逐漸減少Clonidine之用量。
- 9.服用本品可能會降低對Glucose之耐受性，糖尿病患者服用本品時，應多作檢查。

【禁用】

竇性心跳徐緩(Sinus bradycardia)；2~3度心傳導阻礙者；心因性休克(Cardiongenic shock)；無尿症；對本品或Sulfonamide類藥品過敏者禁用本品。

【副作用】

噁心、眩暈、痙攣、厭食、肌肉疲勞、白血球減少，顆粒性白血球減少，血小板減少，再生不能性貧血，停藥後症狀即可消失。

【包裝】2~1000粒瓶裝、鋁箔盒裝。

【儲存】本品存放應避光、熱及潮濕。



PIC/S GMP藥廠

中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線:04-7524166

健康訊息請參閱網站 <http://www.健康之道.tw>