

悠利膚[®]軟膏

U.LIFU[®] Ointment

衛署藥製字第030509號

本劑是一種廣效性之局部用皮膚疾病治療劑，因由四種不同藥理作用之藥物合理配製而成，故有很優良的抗炎、止癢、殺菌和殺黴作用。可用於治療各種皮膚疾病，尤其對於致病菌不明之皮膚病療效卓著。

【效能】

本軟膏用以治療各種濕疹和其他過敏性和發炎性皮膚病，續發性細菌或黴菌感染(念珠菌感染)，包括鼠蹊皮膚病、四肢慢性皮膚炎、紅癬、濕疹樣皮膚炎、接觸性皮膚炎、細菌性皮膚炎、皮囊皮膚炎、汗疱、不全角化、甲溝炎、皮膚搔癢症、溢脂性濕疹、對磨疹、溢脂性皮膚炎、膿疱性痤瘡、膿疱疹、神經性皮膚炎、對光敏感性皮膚炎、苔癬化鼠蹊皮膚菌病，和黴菌感染如足癬、股癬、體癬。

【成分】有效成分及含量：(Each Gram Contains)

Betamethasone	0.5mg
Gentamicin	1mg
Tolnaftate	10mg
Iodochlorhydroxyquin	10mg

其他成分(賦形劑)：Isopropyl Myristate、Propyl Paraben、Butylated Hydroxyanisole、Lanolin Anhydrous、Purified Water、Methyl Paraben、Propylene Glycol、Silicon Oil、Cream Base Wax N-80、Green Tea E9901004、Osmanthus E9925749、Gelol 64

【用途(適應症)】濕疹和其他過敏、感染和發炎性皮膚病。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：(一)曾因本藥成分引起過敏。
- (二)具有皮膚結核、單純疱疹、水痘、帶狀疱疹、種痘疹之患者
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(一)3歲以下。(二)深部皮膚組織感染。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑師藥劑生：
(一)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。(二)正在接受醫師治療。
- (三)患部在臉上。(四)患部化膿。
- 四、其他使用上注意事項：(一)為防止兒童誤食請妥善保管。(二)避免陽光直射。
- (三)勿超過建議使用量或使用次數。(四)使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。(五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。(六)本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，濕疹、浸潤、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。(七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。(八)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

(九)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

(十)一般黴菌感染療程至少為2週，視感染的程度、部位而定。使用本藥須完成全部療程。

(十一)請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。

(十二)皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

(十三)小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。

(十四)癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。

【用法用量】

使用次數	使用方法
1天2-3次	均勻塗於患部

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張。
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)、繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有上述外之其他不適情況產生。

(二)自覺狀況沒有改善或更惡化。

(三)一般黴菌治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4週，如經過前次治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。如即使若症狀改善停藥後，病情復發亦應立即就醫。

【包裝】100公克以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝

【類別】醫師藥劑師藥劑生指示藥品

委託者：

 興中美生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區富基路35號6樓F 電話: 02-87513383

製造廠：

 PICOS GMP 興
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰龍路106號 諮詢專線: 04-7524166
http://www.chungmei.com.tw