



"中美"

呼呼止癢消炎液

Whir Whir itch relief solution "C.M"

薄荷味



衛署藥製字第042245號 G.M.P. G-6292

輕輕一擦 方便不沾手!

本藥為含有去角質及抗發炎、止癢、止痛多重效能之複合性皮膚疾患治療劑，並添加蘆薈萃取物，可改善皮膚乾裂、搔癢疼痛的現象，提供濕疹及各類皮膚炎引起之疼痛搔癢者作為舒緩用。

【特點】

- 1.具抗發炎作用 - Fluocinolone acetonide是一個副腎皮質荷爾蒙，對於各種皮膚搔癢發炎產生之紅腫熱痛症狀均具有減輕及控制之作用。
- 2.止癢之作用 - Diphenhydramine是一種抗組織胺劑，對皮膚刺激引起之皮膚搔癢有效。
- 3.止痛之作用 - 皮膚受刺激後亦發疹進而產生疼痛感，而本劑Dibucaine可止痛。
- 4.角質軟化、保濕作用 - 皮膚炎亦導致皮膚乾燥引發搔癢甚至乾裂現象，本劑添加Urea，其優異之水合力 (Water-binding capacity) 可增強維持角質之含水量。
- 5.添加蘆薈萃取物。

【成分】

有效成分及含量 (Each ml contains):

Fluocinolone acetonide (消炎).....	0.1mg
Dibucaine (止痛).....	10mg
Diphenhydramine Hydrochloride (止癢).....	20mg
Urea (去角質).....	100mg

其他成分(賦形劑): Menthol · Camphor · Diethylene Glycol Monoethyl Ether · Aloe Vera Gel · Alcohol 95% · Purified Water

【用途(適應症)】昆蟲咬傷、皮膚炎或濕疹，或皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢，暫時緩解皮膚搔癢，去角質。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。(二) 2歲以下之兒童。
- 二、有下列情形者，請洽醫師診治：(一) 深部皮膚組織感染。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- (一) 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項

- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二) 避免陽光直射。
- (三) 勿超過建議使用量。
- (四) 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- (五) 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。
- (六) 本藥勿使用於大面積之體表 (以使用者的兩手掌面積為參考) 或皮膚深部感染。
- (七) 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- (八) 類固醇：
 - 1、類固醇抗發炎劑不可連續使用超過二星期
 - 2、皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
 - 3、小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
 - 4、臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
- (九) 抗組織胺劑：連續使用超過三星期時，有增加過敏性接觸性皮膚炎的可能性。
- (十) 局部麻醉藥：不得大量使用，以避免全身性吸收 (曾有致死報告)。

【用法用量】1~2次/天，塗於患部。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張、局部灼熱、偶有過敏性反應。
全身性	庫欣氏症候群 (如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足 (如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 自覺狀況沒有改善或更惡化。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【包裝】4000毫升以下鋁罐裝、塑膠瓶裝、玻璃瓶裝。

【儲存】25°C以下避光儲存。

委託者：

興中美生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區基湖路35巷6號5F 電話: 02-87513383

製造廠：



PIC/S GMP 藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰德路106號 諮詢專線: 04-7524166
http://www.chungmei.com.tw