

“中美” 膚諾痛[®]外用液

FUNOTON EXTERNAL SOLUTION "C.M."

衛署藥製字第046987號 G.M.P. G-8573

【成分】 Each ml contains :

有效成分及含量：

Benzethonium chloride.....1mg Naphazoline Hydrochloride...1mg

Dibucaine Hydrochloride...1mg Chlorpheniramine Maleate.....2mg

其他成分(賦形劑)：Glycerin、Aloe Vera Gel、Purified Water

【用途(適應症)】傷口消毒、昆蟲咬傷或皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢，及暫時緩解皮膚搔癢。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，請洽醫師診治：深部皮膚組織感染。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：
 - 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項
 - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二) 避免陽光直射。
 - (三) 勿超過建議使用量。
 - (四) 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
 - (五) 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。
 - (六) 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
 - (七) 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
 - (八) 因含抗組織胺劑：連續使用超過二星期時，有增加過敏性接觸性皮膚炎的可能性。
 - (九) 局部麻醉藥：不得大量使用，以避免全身性吸收(曾有致死報告)。

【用法用量】一日3~4次，噴霧於患部，或浸溼紗布、脫脂棉塗敷於患部。

說明：噴霧式：用於廣範圍的患部和毛髮式的治療。

洗淨式：使之直接流入污穢的傷口，沖去異物(泥或沙)，充分洗淨。

浸濕紗布或脫脂棉的方法：用於肛門外陰部的消毒或眼睛上方的受傷等。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	局部灼熱、刺痛、偶有過敏性反應。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 自覺狀況沒有改善或更惡化。

【本藥特色】無色、無味，使用後不留痕跡。

【藥理作用】 依文獻記載：

Benzethonium chloride(抗菌)：對無芽孢之細菌及黴菌有廣泛之抗菌效果。

Naphazoline Hydrochloride(消腫)：作用於 α -adrenergic receptor受體而使血管收縮，對表淺傷口的使用，可消除充血，縮小腫脹，具有收斂效果。

Dibucaine Hydrochloride(止痛)：局部麻醉劑，止痛、止癢效果更顯著。

Chlorpheniramine Maleate(止癢)：抗組織胺的一種，具抗過敏及止癢效果。

【類別】醫師藥劑生指示藥品。

【包裝】4000毫升以下塑膠瓶裝。儲存於25°C以下。

委託者：

興中美生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區基湖路35巷6號5F

製造廠：



PIC/S GMP藥廠

中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線：04-7524166

http://www.chungmei.com.tw