

"中美" 鼻舒康噴鼻液

Bisoucan Nasal Spray "C.M."

衛署藥製字第049759號 GMP G-10314

【成分】

有效成分及含量：(Each ml contains)

Naphazoline HCL	0.5mg
Diphenhydramine HCL	2mg
Procaine HCL	10mg

其他成分(賦形劑)：Hydroxypropyl Methylcellulose、Potassium Phosphate Monobasic、Sodium Chloride、Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous、Propylene Glycol、Benzalkonium Chloride 50% Solution、Purified Water、Sodium Phosphate Monobasic

【用途(適應症)】鼻炎、副鼻腔炎、過敏性鼻炎所引起之流鼻水、鼻塞及鼻出血。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

- (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- (二) 哺乳婦。
- (三) 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)期間，或停用MAOI兩星期內。如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- (一) 12歲以下。
- (二) 嚴重代謝性肝腎疾病的人。
- (三) 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。
- (四) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難及青光眼的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- (一) 孕婦、可能懷孕婦女。
- (二) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- (三) 65歲以上。
- (四) 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮量藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。

四、其他使用上注意事項

- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二) 勿超過建議使用量，請勿超過單日最高建議使用量(一天4至5次)。
- (三) 使用本製劑不可連續超過三日，長期或過度使用可能會導致反彈性鼻塞。
- (四) 避免陽光直射。
- (五) 本製劑為外用劑劑，不得用於點眼或內服，如不慎食入需立即就醫。
- (六) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
- (七) 本品可能引起短暫不適：灼熱、刺激、打噴嚏、鼻涕增加。
- (八) 不得與酒精性飲料併用。

【用法用量】

成人及12歲以上	依需求每個鼻腔最多一天4至5次，每次向鼻腔內各噴霧1~2遍。
12歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴、倦怠感、興奮
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、口乾、視覺上之困擾

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。
- (三) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏，搔癢及紅疹。

【包裝】100ml以下塑膠瓶裝、玻璃瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存條件】25°C以下避光儲存

委託者：

中美生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區基湖路35巷6號5F 電話: 02-87513383

製造廠：

中美兄弟製藥股份有限公司
PIC/S GMP藥廠
彰化市彰鹿路106號 諮詢專線: 04-7524166
http://www.chungmei.com.tw