

“中美”

伏您炎口腔消炎噴液劑

1.5公絲/公撮 (本基達明)

Free-end Anti-inflammatory spray 1.5mg/ml "C.M."
(Benzydamine)

衛署藥製字第045389號 G-7880

薄荷味

【成分】每公撮含Benzydamine hydrochloride 1.5公絲

【性質】

伏您炎口腔消炎噴液劑為一口味佳、綠色澄清溶液，含benzydamine hydrochloride 0.15%w/v。Benzydamine 的化學名為1-Benzyl-3-(3-dimethylaminopropoxy)-1H-indazole。Benzydamine hydrochloride 為一白色、無臭、味苦之結晶性粉末，可溶於水、酒精、甲醇和氯仿，略溶於乙醚和石油醚。

【藥理學特性】

Benzydamine 為一抗炎止痛劑，其化學結構為非類固醇，並與其它的非類固醇類抗炎藥性質不同，是一鹼類而非酸類。

動物實驗顯示使用全身性的benzydamine 可有效的治療發炎引起的疼痛及水腫，亦可抑制肉芽腫的生成。在局部的治療濃度下，Benzydamine 具有局部麻醉作用。大鼠口服benzydamine 達劑量 100mg/kg，並未造成胃黏膜潰瘍。

Benzydamine 對發炎性的疼痛其止痛效果較非發炎性的疼痛為佳，和aspirin類似藥品相同，benzydamine 亦具有解熱作用。

貓靜脈注射benzydamine，會短暫抑制其周邊反射反應。

【作用方式】

Benzydamine 抗發炎的作用機轉與刺激腦下腺、腎上腺軸無關，其與其它的非類固醇類抗炎藥相同，在某些情況下benzydamine 的作用方式為抑制前列腺素的合成，但其特性尚未完全闡明。穩定細胞膜亦為其作用機轉之一。

【藥物動力學特性】

《吸收》 Benzydamine 口服吸收良好，投與局部作用之伏您炎口腔消炎噴液劑，benzydamine 可被發炎的口腔黏膜完全吸收並產生抗發炎和局部麻醉作用。

《排泄》 Benzydamine 和其代謝物大多由尿中排除，代謝主要是以氧化方式為主，亦可見dealkylation產物。使用後在血及尿中可測得benzydamine，大部分被吸收的藥品可在最初的24小時內排除。持續給藥7天，benzydamine 亦不會在血漿中蓄積。

【適應症】

舒解口腔及咽喉疼痛，包括下列疾病或症狀所引起的疼痛：扁桃腺炎、喉嚨痛、放射治療引起的黏膜炎、鵝口瘡潰瘍、口腔及牙周手術後的疼痛。

【用法用量】 一般使用時不應稀釋，若發生灼熱及刺痛感時，可以水稀釋之。

持續治療不宜超過7天。本藥須由醫師處方使用。

《成人劑量》 一般使用量為直接噴5-10次的噴液劑於疼痛和發炎的部位，再輕輕吞下。若需要，可每1.5至3小時重覆一次。

《兒童劑量》 一般使用量為直接噴5次的噴液劑於疼痛和發炎的部位，再輕輕吞下。若需要，可每1.5至3小時重覆一次。

【禁忌】 已知對本藥及其賦型劑過敏的患者。

【注意事項】 若喉嚨痛為細菌感染或併發感染引起的，除了使用伏您炎口腔消炎噴液劑之外，應考慮加上適當的抗菌劑治療。肝及腎功能不全的患者應小心使用之（請參考用法用量）。

【藥品交互作用】 尚無已知會與benzydamine 發生交互作用的藥物。

【孕婦的使用】 孕婦使用benzydamine hydrochloride的安全性尚未建立，若要使用伏您炎口腔消炎噴液劑時必須評估過，其效益性勝過其潛在的危險性，始可使用。

【孩童的使用】 由於缺乏足夠的臨床經驗，6歲以下孩童使用時，請洽詢醫師後使用。

【不良反應】 一般而言伏您炎口腔消炎噴液劑的耐受性佳且副作用低，局部不良反應：最常被報告的不良反應為口部麻木（2.6%）。偶爾會灼熱及刺痛感被報告（約1.4%）。其它的局部不良反應極少見，包括口乾或口渴（0.2%）、刺痛感（0.2%）、口部溫熱感及味覺改變（<0.1%）。全身性的不良反應：極罕見且極輕微。主要是噁心、嘔吐、乾嘔、胃腸不適（0.4%）、頭昏（0.1%）、頭痛和嗜睡（<0.1%）。

【腎功能不全患者的使用】 由於吸收的benzydamine 和其代謝物大多由尿中排除，嚴重腎功能不全患者應考慮可能有全身性的作用。

【肝功能不全患者的使用】

由於吸收的benzydamine 大多在肝臟代謝，嚴重肝功能不全患者應考慮可能有全身的作用。

【過量】 尚無benzydamine hydrochloride 溶液過量的病例報告。即使不小心吞服亦不可能產生全身性的不良反應。目前Benzydamine 無特定的解毒劑，若發生過量時，應針對其症狀來治療。

【貯存】 避光貯存於25°C以下。

【包裝】 100公撮以下塑膠瓶與玻璃瓶裝。



中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線:04-7524166

健康訊息請參閱網站 <http://www.健康之道.tw>